

JLU

免疫学实验-多克隆抗体的制备

吉林大学 生命科学学院 生物实验教学示范中心
王飞 fei@jlu.edu.cn

实验项目


▪ 酶标仪的工作原理及操作流程	姜丹
▪ 多克隆抗体的制备	王飞
▪ T淋巴细胞转化试验	于彬
▪ NK细胞毒活性的检测	王迪

内容提要

- 1 抗体的产生及免疫功能
- 2 抗体的临床及科研应用
- 3 抗体制备原理
- 4 ELISA法测定抗体效价

免疫系统概述

- ❖ Immune system: protect against disease
- ❖ Major target: detect and distinguish pathogens (virus, bacteria, fungi, parasite, others)
- ❖ **Innate/固有** immune system: nonspecific rapid (leukocyte, NK cell, complement)
scavenge recruit activate
- ❖ **Adaptive/适应性** immune system: specific slow (lymphocyte, antibody)
recognize tag memory



概念

- ❖ **抗原(antigen)**: 能刺激机体免疫系统产生抗体和/或致敏淋巴细胞, 并能与相应抗体或致敏淋巴细胞在体内外发生特异性结合而出现反应的物质。
- ❖ **抗体(antibody)**: 机体的免疫系统在抗原刺激下, 由B淋巴细胞增殖分化形成的浆细胞所产生的, 可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。主要分布在血清中, 也分布于组织液及外分泌液中。

抗体的产生及功能

- ❖ 抗体的产生：
B细胞被激活后分化为浆细胞并分泌抗体。
- ❖ 抗体的免疫学功能：
识别病原菌表面抗原
阻止病原菌侵袭体细胞
介导特异性免疫攻击

抗体的科研应用

- ❖ 免疫沉淀 免疫共沉淀
- ❖ 免疫印迹
- ❖ 免疫荧光染色
- ❖ 流式细胞术

Western blot analysis of total cell lysate, mitochondrial fraction, and cytosolic fraction for GAPDH, PCNA, and SOXB. Molecular weight markers are indicated at 37KD and 25KD.

Flow cytometry plots showing cell populations with percentages: 25%, 11.9%, 72.6%, and 10.4%.

Immunofluorescence images showing cell morphology and protein localization (TUNEL, double, mt hsp78, p53).

抗体的临床应用

- ❖ 检测待测抗原
妊娠检测 血型鉴定 病原菌鉴定 ELISA
- ❖ 癌症靶向治疗
直接激活NK细胞 挂载药物

诊断血清	抗A	抗B
A	+	-
B	-	+
AB	+	+
O	-	-

抗体制备的目标

ANTIBODY CLASSES

The diagram illustrates the structural differences between antibody classes: IgG (monomer), IgA (dimer), IgM (pentamer), and IgE (monomer).

抗体制备原理

- ❖ 首次免疫：B细胞活化为浆细胞和记忆B细胞，浆细胞分泌抗体，IgG含量不高。首免响应速度慢，延迟期6-10天。
- ❖ 再次免疫：2-4次，激活液体中驻留的记忆B细胞，分化为浆细胞并分泌抗体，IgG含量高。再免响应速度快，延迟期短。
- ❖ 免疫间隔：首免与二免间隔10天以上，确保记忆B细胞产生。再免间隔不固定，一般是7天。
- ❖ 抗体制备的收集对象：
再免激活的浆细胞（单抗制备）
再免产生的抗体（多抗制备）


抗体制备原理

The graph plots antibody levels against time (Days). It shows the primary response (Primary response) and secondary response (Secondary response). Key phases include the latent period (潜伏期) and the peak of total antibody (总抗体量). Specific antibody classes like IgM and IgG are also tracked.

Labels: 初次抗原刺激 (primary immunization), 再次抗原刺激 (secondary immunization), 初次及再次免疫应答抗体产生的一般规律.

抗体制备的产物类型

- ❖ **抗原决定簇 (epitope / antigenic determinant)** : 抗原表面能够被抗体特异识别的约6个氨基酸或糖基组成的结构域。




13

抗体制备的产物类型


- ❖ **单克隆抗体 (monoclonal antibody)** : 由一种浆细胞产生的, 只识别一种抗原决定簇的抗体。
- ❖ **多克隆抗体 (polyclonal antibody)** : 由多种浆细胞产生的, 识别同一抗原的多个抗原决定簇的多种抗体的集合。

14



杂交瘤细胞融合技术

- ❖ B细胞: 能分泌抗体, 无法增殖。
- ❖ 骨髓瘤细胞: 能永久传代
- ❖ 杂交瘤细胞: 能分泌抗体能永久传代。
- ❖ 聚乙二醇 (PEG) 融合剂
- ❖ HAT筛选 (第一次筛选)
- ❖ 抗原筛选 (第二次筛选)



HAT选择

- ❖ DNA合成途径: 主要途径, 替代途径
- ❖ HAT培养基: 抑制主要途径
- ❖ B细胞: 具备替代途径, 无法增殖, 自然死亡。
- ❖ 骨髓瘤细胞: 替代途径缺失, 无法生长。
- ❖ 杂交瘤细胞: DNA替代途径正常, 具备增殖能力, 稳定传代。

免疫佐剂

- ❖ **佐剂 (adjuvant)** : 一类非特异性免疫增强剂, 先于抗原或与抗原一起注入机体, 可增强机体对抗原的免疫应答或改变免疫应答类型。
- ❖ **作用原理**: 增加滞留时间、增强机体免疫敏感性
- ❖ **佐剂种类** 很多, 见百度。

弗氏佐剂 (Freund's adjuvant)

- ❖ 抗体制备时常用的佐剂
- ❖ 弗氏不完全佐剂
羊毛脂+液体石蜡
- ❖ 弗氏完全佐剂
羊毛脂+液体石蜡+卡介苗
- ❖ 首次免疫用完全佐剂，再次免疫用不完全佐剂。
- ❖ 羊毛脂、液体石蜡：油包水乳液，增加滞留时间。
- ❖ 卡介苗：增强免疫系统敏感性。提升抗原递呈能力。

多克隆抗体的分离与纯化

- ❖ 抗血清的制备：
取血，离心
- ❖ 亲和层析纯化：
ProteinA/G（中性亲和，酸性解离），所有抗体。
抗原亲和纯化，特异抗体。

单克隆抗体分离与纯化

- ❖ 杂交瘤细胞体内培养：取腹水
- ❖ 杂交瘤细胞体外培养：收集培养基上清
- ❖ 亲和层析纯化：
ProteinA/G（中性亲和，酸性解离），所有抗体。
抗原亲和纯化，特异抗体。

酶联免疫吸附测定




ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay)

酶联免疫吸附实验

- ❖ 原理：在固相载体上包被抗原，用相应的抗体与之识别，形成锚定在固相载体上的抗原-抗体复合物。复合物内暴露在最外端的抗体为酶标抗体，在加入相应底物后可以催化底物的生色反应，进而通过分光光度计的度数来判断复合物的生成量。


ELISA分类

- ❖ 直接法
- ❖ 间接法
- ❖ 双抗夹心法



间接法ELISA测定抗体效价

- ❖ 抗体效价：抗体样本与特定抗原间亲和能力的直接评价指标。
- ❖ 抗体效价由两方面因素决定：
 - 有效抗体的数量
 - 抗体与抗原表面决定簇间的亲和能力
- ❖ 间接法ELISA是目前测定抗体效价最常用的技术



固相载体-包被

❖ ELISA中可用的固相载体的材料有很多，最常用的是聚苯乙烯 (Polystyrene)

- ❖ 非特异物理吸附：疏水相互作用
- ❖ 包被缓冲液：PH9.6 >PI 负电表面抑制蛋白间相互作用

封闭 洗涤

- ❖ 封闭: 非特异蛋白封闭未被抗原覆盖的固相载体表面。牛奶 BSA
- ❖ 洗涤: 去除非特异识别的抗体, 降低背景。
温和表面活性剂: Tween-20

催化生色反应的酶

- ❖ 辣根过氧化物酶(horseradish peroxidase, HRP)
 $DH_2 + H_2O_2 \rightarrow D + H_2O$
 DH_2 为供氢体, H_2O_2 为受氢体
- ❖ 常用供氢体:
 - 邻苯二胺(OPD) 490nm吸收峰
 - 四甲基联苯胺(TMB)
 - 2,2-联氮-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二铵盐 (ABTS)
- ❖ 酸性条件反应终止

效价判定

- ❖ 抗体效价:
 - 二倍于阴性对照OD值所对应的抗体稀释度

稀释度 (倍)	4000	8000	16000	32000	64000	128000	256000	阴性对照
OD值	0.4	0.3 5	0.3	0.25	0.2	0.15	0.11	0.08

抗体效价: 64000-128000
受限于实验条件, 不做线性回归, 不计算准确效价。

实验目的


- ❖ 制备鸡卵清白蛋白 (OVA) 的鼠源多克隆抗体
- ❖ 酶联免疫标记技术 (ELISA) 检测多克隆抗体的效价

实验材料及仪器

- ❖ 小鼠饲养及免疫
小鼠, 鼠笼, 垫料, 饲料, 记号笔, 注射器, 眼科手术剪, 弗氏完全佐剂, 弗氏不完全佐剂, 生理盐水, OVA
- ❖ 血清制备及效价检测
弯头镊子, 眼科手术剪, 离心管, 记号笔, 离心机, 移液器, 96孔板, pH9.6 碳酸盐缓冲液, PBS缓冲液, 脱脂奶粉, Tween-20, OPD, H_2O_2 , 硫酸, pH5.0 柠檬酸-磷酸缓冲液, OVA, HRP标记山羊抗鼠IgG抗体, 酶标仪


实验流程

- ❖ 首次免疫
- ❖ 二次免疫
- ❖ 三次免疫
- ❖ 取血制备血清
- ❖ 梯度稀释血清
- ❖ ELISA法测效价



免疫程序

时间 \ 组别	有佐剂组	无佐剂对照组	阴性对照组
Day 0 皮下注射	40ugOVA 弗氏完全佐剂	40ugOVA	生理盐水
Day 14 皮下注射	40ugOVA 弗氏不完全佐剂	40ugOVA	生理盐水
Day 21 腹腔注射	40ugOVA 弗氏不完全佐剂	40ugOVA	生理盐水
Day 28	取血	取血	取血



注意事项

- ❖ 戴手套操作
- ❖ 注射器针头用后及时盖帽
- ❖ 文字记录标记方法
- ❖ 经常检查标记保存状况

JLU

ELISA法检测抗体效价

课前讲解

间接法ELISA测抗体效价流程

1. 包被抗原		<p style="font-size: small;">血清稀释度 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 阳性对照 阴性对照</p>
2. 洗涤		
3. 加待检抗体		
4. 洗涤		
5. 加酶标抗体		
6. 洗涤		
7. 加底物显色		
8. 观察结果		

材料及试剂成分


- ❖ 96孔ELISA板、移液器、镊子、离心管
- ❖ 抗原包被液：50ug/ml OVA in 0.05M碳酸盐缓冲液，pH9.6
- ❖ 封闭液：5%脱脂奶粉 in PBS pH7.4
- ❖ 抗体稀释液：PBS pH7.4
- ❖ 二抗：HRP标记羊抗鼠抗体，1:5000 稀释
- ❖ 洗涤液(PBST)：0.1%Tween-20 in PBS pH7.4
- ❖ 显色液：0.04%OPD、0.15%H2O2 in 柠檬酸-磷酸缓冲液 pH5.0
- ❖ 终止液：2M硫酸

取血

- ❖ 摘取小鼠眼球，用1.5ml EP管接血。
- ❖ 4000rpm，离心5分钟，吸取上清（血清）待用。
- ❖ 拉颈处死小鼠。



抗血清梯度稀释




三种抗血清各做一套稀释梯度

ELISA步骤

- ❖ **包被:** OVA抗原(50ug/ml) 100μL/孔, 4℃过夜。(已完成)
- ❖ **封闭:** 弃上清, 加入封闭液 150μL/孔, 37℃, 30min.
- ❖ **洗涤:** 弃封闭液, 加洗液200ul/孔, 弃上清, 洗一次.
- ❖ **一抗:** 弃上清, 加入不同稀释度的待测血清抗体100μL/孔 37℃, 30min. **黄**
- ❖ **洗涤:** 弃一抗, 加洗液200ul/孔, 弃上清, 洗三次.
- ❖ **酶标抗体:** 加入HRP标二抗100 μL/孔37℃ 30min. **黄**
- ❖ **洗涤:** 弃二抗, 加洗液200ul/孔, 弃上清, 洗三次.
- ❖ **显色:** 加入底物100 μL/孔, 避光约15min (观察颜色) **黄**
- ❖ **加终止液:** 加2M硫酸 50 μL/孔。加入顺序及速度与显色液一致。 **黄**
- ❖ **测量:** 酶标仪测定OD 490nm值.

加板方法

每个稀释度做三复孔, 第四孔留空



注意事项

- ❖ EP管做好标记
- ❖ 离心配平
- ❖ 移液器操作: 缓吸缓吐, 用后恢复到最大量程
- ❖ 加板: 枪尖对准孔壁
- ❖ 禁止磕板
- ❖ 弃上清: 用力倒扣, 甩掉残留液体, 避免孔间污染

Thank You !